

Tables and charts

Klinisk Institut & Institut for Psykologi

Tabel 3.2.1 Oversigt over forskellige typer af voldsindsatser samt overførbareheden af dem til en dansk kontekst

Indsats	Effekt	Overførbarehed af fund til dansk kontekst*
Indsats rettet mod gravide/mødre der involverer hjemmebesøg	Kan muligvis reducere partnervold	Mellem til lav
Indsats rettet mod gravide med kognitiv adfærdsterapi	Kan muligvis reducere partnervold og depression	Lav
Korte indsatser (<12 timers varighed)	Kan muligvis fysisk, psykisk og seksuel sundhed samt depression	Lav
Intensive indsatser (>12 timers varighed)	Kan muligvis reducere fysisk, psykisk og seksuel vold samt forbedre mental sundhed	Mellem til lav
Digitale indsatser	Kan muligvis reducere fysisk, psykisk og seksuel vold samt forbedre mental sundhed	Lav
Individuel kognitiv adfærdsterapi koblet med parterapi	Kan muligvis reducere partnervold	Lav
Parterapi og indsatser med forholdsforståelse	Kan muligvis reducere partnervold	Lav

*Overførbareheden er vurderet til at være "lav", "mellem" eller "høj" på grund af manglende effekt i de fleste studier, hvis kontekst ikke er sammenlignelig med den danske. Overførbareheden er vurderet til at være "mellem", "høj" eller "lav" på grund af manglende effekt i de fleste studier, hvis kontekst ikke er sammenlignelig med den danske men også dokumenteret i enkelte studier, der er udført i lande, hvis kontekst er sammenlignelig med Danmark. Lande der er sammenlignelige med Danmark, er europæiske lande, Australien/New Zealand og Canada.

03.03 Beskrivelse og kvalitet af studier med indsatser mod vold

Der er identificeret syv oversigtsartikler, der opsummerer evidensen omkring voldsindsatser rettet mod gravide, nye og kommende forældre, eller hvor disse er en subgruppe af studiepopulationer. Ydermere er der fundet tre randomiserede forsøg med indsatser rettet mod gravide, nye og kommende forældre. De tre randomiserede forsøg foregår i henholdsvis New Zealand, Norge og Belgien (Fergusson, 2013; Eilathen, 2022; Van Paoy, 2017). En individuel gennemgang af hver oversigtsartikel fremgår af bilag 1, mens kvalitetsvurderingen af oversigtsartiklerne fremgår af bilag 2. En individuel gennemgang af de randomiserede forsøg fremgår af bilag 3 mens kvalitetsvurderingen af de randomiserede forsøg fremgår af bilag 4. Overordnet set illustrerer studierne, at evidensen omkring indsatser er heterogen og indhold, målgruppe, længde, format og type af indsats varierer på tværs af studier. Der er således ikke nogen entydig evidens for, hvilken type af indsats, der er mest effektiv for gravide, kommende og nye forældre, og det er ikke meningsfuldt at lave samlede oversigtstabeller omkring indsatserne. Derfor vil

Klinisk Institut & Institut for Psykologi

Tabel 3.5.1 Indsatser rettet mod par og deres effekt på partnervold og mental sundhed

Type af indsats	Kort opfølgning	Lang opfølgning
Forholdsforståelse (6 studier) [20]	-	p<0.05 (ingen effektmål rapporteret)
Parterapi (1 studie) [20]	-	p<0.05 (ingen effektmål rapporteret)
Kognitiv adfærdsterapi for krigsveteraner (2 studier) [20]	Både mænd og kvinder rapporterede færre hændelser med partnervold (ingen effektmål rapporteret)	Både mænd og kvinder rapporterede reduktion af partnervold ved 12 måneders opfølgning (ingen effektmål rapporteret)
Langvarig familieredningsindsats [24]	-	p=0.001 (ingen effektmål rapporteret), effekt størrelse 0.34; >0.80 (ingen effektmål rapporteret) p=0.001 (ingen effektmål rapporteret), effekt størrelse 0.16; >0.20 (ingen effektmål rapporteret)


03.06 Sammenfatning af resultater med intensive versus korte indsatser

Konklusion

På baggrund af litteraturen er det muligt, at både korte (<12 timers varighed) og intensive indsatser (>12 timers varighed) kan være effektive for at reducere vold og forbedre mental sundhed. Data er sparsomme, og resultaterne kan i nogen grad overføres til en dansk kontekst.

```

    graph LR
      A[Korte indsatser rettet mod voldsudsatte] --> B[Kan muligvis reducere partnervold  
Kan muligvis forbedre mental sundhed]
      C[Intensive indsatser rettet mod voldsudsatte] --> D[Kan muligvis reducere partnervold  
Usikkert om det forbedrer mental sundhed]
    
```



Templafy contains prototypes of boxes, arrows and charts in the SDU design that can be used freely. Tables, diagrams and charts should ideally be kept entirely in black and white. We have collected some examples of how tables and diagrams can look within SDU's design guide.